

## INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES DE VACUNES NO INCLOSES DINS EL CALENDARI VACUNAL DEL SERVEI CATALÀ DE SALUT

### VACUNA FRONT AL ROTAVIRUS (ROTATEQ I ROTARIX)

El Rotavirus és un virus que causa gastroenteritis aguda, o sigui una malaltia que provoca diarrea, sovint associat a vòmits (generalment al principi), dolor abdominal i febre, sobretot en nens menors de 5-6 anys. Al nostre medi no sol provocar complicacions greus, sobretot si es tracta correctament amb líquids, però algun cop obliga a ingressar els nens a l'hospital per rehidratar per via endovenosa, sobretot en els nens menors de 1 any.

La vacunació és molt efectiva. A Espanya estan comercialitzades dues vacunes anomenades Rotateq i Rotarix que s'administren via oral (begudes).

La vacunació cal iniciar-la a partir de les 6 setmanes de vida. **Rotarix** necessita **2 dosis** (separades com a mínim 1 mes) i ha d'estar completada a les 26 setmanes d'edat (sis mesos i mig), mentre que el **Rotateq** necessita **3 dosis** (també separades 1 mes) i ha d'estar completada a les 32 setmanes de vida (8 mesos de vida). La eficàcia de les dos vacunes és similar.

### VACUNA FRONT LA MENINGITIS B (BEXSERO)

La meningitis és una malaltia infecciosa molt greu i potencialment mortal. Gràcies a les vacunes sistemàtiques, la del Meningococ C, el Pneumococ i l'Haemophilus Influenzae B ha disminuït notablement aquesta malaltia. Però fins ara deixàvem al descobert el meningococ B. El tipus B és el tipus més freqüent de meningococ a Europa i fins ara no teníem vacuna disponible per prevenir-la. Aquest bacteri anomenat Meningococ B produeix una meningitis invasiva que en poques hores d'evolució pot tenir conseqüències greus, seqüeles neurològiques greus i fins i tot la mort. Aquesta vacuna és segura, tot i que pot provocar efectes secundaris, semblants a la resta de les altres vacunes. És compatible amb la resta de vacunes del calendari a excepció de la meningitis C, per manca d'estudis. De totes maneres, es recomana no administrar-la amb altres vacunes perquè pot augmentar la probabilitat de tenir febre secundària a la seva administració.

Aquesta vacuna és diu **Bexsero**. Es pot iniciar la vacunació a partir dels 2 mesos i depenen de la edat el nombre de dosis varia.